

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y recomendaciones dadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas. Evitar mezclas con productos alcalinos, cuyo pH sea igual o mayor que 8. Siempre es conveniente hacer pruebas de compatibilidad antes de mezclarlo con otro producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

FIGHT CT 60 SC no es inflamable ni corrosivo. No almacenar ni transportar junto con alimentos de consumo humano y animal. Almacenarse y transportarse en su envase original en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapaces. En caso de derrames, absorba con arena o arcilla, recoja y deposítela en un lugar destinado para su posterior eliminación.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO**



BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA

SINTOMAS DE INTOXICACION:

La ingestión del producto puede provocar dolor abdominal, náusea, vómito y salivación. La inhalación puede irritar las vías respiratorias. El contacto con los ojos puede causar irritación. No es irritante ni sensibilizador de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: No induzca el vómito. Si la persona está consciente, de a beber uno o dos vasos de agua. Busque atención médica inmediatamente.
POR INHALACION: Llevar a la persona afectada al aire fresco. Busque atención médica inmediatamente.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos. Busque atención médica inmediatamente.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada y lavar las áreas afectadas con agua y jabón.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZA EL VOMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No se conoce antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático. Si se han ingerido grandes cantidades, realice lavado gástrico, cuidando de no provocar aspirado pulmonar. Administre carbón activado para disminuir la absorción gastrointestinal.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

| INSTITUCION | PAIS | TELEFONO |
|--|-----------|----------------------------|
| Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT | Guatemala | 1-801-0029832 2232-2322 |
| Hospital Escuela Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos | Panamá | 523-4948 y 523-4968 |

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

**TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS,
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O
EMPAQUES VACIOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

La destrucción de envases debe hacerse a través del triple lavado, perforación de envases y entrega a los centros de acopio para su eliminación técnicamente aceptada, para evitar la contaminación ambiental. Los desechos resultantes del uso de este producto debe ponerse en un lugar adecuado aceptado para los mismos. En caso de derrames absorba con arena o arcilla, recoja y deposítela en un lugar destinado para posterior eliminación. No contamine fuentes de agua.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN
PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTIA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase esta acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control sobre la aplicación, dosificación y mezcla con otros productos y otros factores relacionados con el uso directo de este producto, el formulador y distribuidor no se responsabilizan de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de este.

**FORMULADO POR:
FORAGRO, S.A.**
Km. 156 Carretera al Semillero,
Tiquisate, Escuintla
Guatemala, C.A.

**DISTRIBUIDO POR:
TIKAL AGROSOLUTIONS**
20 Avenida A 3-26 zona 15
Vista Hermosa I
Guatemala, C.A.

PBX: (502) 2329-1919 Fax: (502) 2329-1911

| PAIS | No. REGISTRO | FECHA DE REGISTRO |
|-----------|--------------|-------------------|
| GUATEMALA | 752-128 | 21-04-10 |
| HONDURAS | 512-F341-TII | 17-10-13 |
| PANAMA | 7279 | 16-07-15 |

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS**

FIGHT CT 60 SC

FUNGICIDA-MORFOLINA, BENZONITRILLO HALOGENADO
DIMETHOMORPH, CHLOROTHALONIL

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.2347 g/mL a 20° C.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICION**

**"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION"
"MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"**

**USO AGRONOMICO****MODOS DE ACCION:**

FIGHT CT 60 SC es un fungicida con acción sistémica y protectante, con efecto translaminar y antiesporulante. Debe utilizarse preferiblemente en forma preventiva y en forma curativa en las primeras etapas de las enfermedades causadas por hongos.

EQUIPO DE APLICACION:

FIGHT CT 60 SC puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (manual o mecanizado). Se recomienda utilizar boquillas de cono hueco. Antes de la aplicación revisar que el equipo de aspersión este en buen estado de funcionamiento. Calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta y que garantice un buen cubrimiento del follaje. Después de cada aplicación lave el equipo de aplicación y protección. Debe usarse el equipo de protección recomendado: Botas de hule, mascarilla, lentes, guantes, dosificador y aplicador.

**FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:**

Llene el tanque de mezcla o aspersión a la mitad con agua, en un recipiente aparte haga una pre mezcla del producto y agua, luego agregue esta pre mezcla al tanque, agite, complete el llenado con agua, agite bien y aplique.

Verifique la calidad del agua para no usar aguas duras (aguas que contengan más de 300 ppm de CaCO₃) y obtener una mejor eficacia del producto.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

FIGHT CT 60 SC debe ser aplicado de forma preventiva o cuando la enfermedad este en sus etapas iniciales. No aplique en presencia de vientos fuertes que favorezcan la deriva. Las aplicaciones deben realizarse en las horas de la mañana o por la tarde, evitando las altas temperaturas. La temperatura ideal de aplicación es de 15-30 °C.

Recomendado para el control de hongos en Guatemala, Honduras y Panamá:

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS |
|--|--|--------------------|
| Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i> | Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> | 700 mL/200L |
| Papa <i>Solanum tuberosum</i> | | o |
| Melón <i>Cucumis melo</i> | Mildiu veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> | 1.4L/ha/400 L agua |
| Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> | | |

INTERVALO DE APLICACION:

Puede ser aplicado cada 7 - 14 días. En melón y sandía realizar tres aplicaciones por ciclo de cultivo. Inicie la aplicación 7 días después de la siembra.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

Melón y sandía. 15 días.
Tomate y papa. 7 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

24 horas.

