



Inicio > Productos e Innovación > Insecticidas > Jade

Jade 0,8 GR

Países con registro:	Costa Rica, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua y República Dominicana
Ingrediente activo:	Imidacloprid
Familia Química:	Neonicotinoide
Formulación:	Granulado
Modo de acción:	Sistémico

Recomendaciones:

Intervalo de aplicación: 60 días si hay reaparición de la plaga.

Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: Chayote: 3 días. Banano y plátano: 0 días. Resto de cultivos: 21 días.

Intervalo de reingreso al área tratada: 24 horas

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones.

Compatibilidad: Jade® 0,8 GR se aplica solo.

Cultivo	Plagas	Dosis
Recomendaciones de uso para Costa Rica		
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Salivazo <i>Aeneolamia postica</i>	16 kg / ha
Pastos	Salivazo <i>Aeneolamia postica</i>	16 kg / ha
Banano y Plátano <i>Musa spp.</i>	Picudo negro <i>Cosmopolites sordidus Germar</i>	25-31,25 g/planta
Verbena <i>Verbena hortensis</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	20-40 kg/ha 1-2 g/planta
Chayote <i>Sechium edule</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	60 g/planta
Recomendaciones de uso en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Panamá		
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Gusano alambre <i>Agriotes sp, Conoderus sp.</i> Termitas <i>Heterotermes sp.</i> Chinche salivosa, Salivazo o Mosca pinta <i>Aeneolamia spp.</i> Salta hojas <i>Perkinsiella sp.</i> Pulgones <i>Sipha sp.</i> Chinche de encaje <i>Leptodictya sp.</i>	16 kg / ha (11 Kg/mz)
Mani <i>Arachis hipogaea</i>	Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Gusano alambre <i>Agriotes sp.</i> Tortuguilla <i>Diabrotica spp.</i>	16 kg / ha (11 Kg/mz)
Pastos	Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Gusano alambre <i>Melanotus spp, Agriotes sp.</i> Hormiga ladrona <i>Atta spp.</i>	16 kg / ha (11 Kg/mz)

	Mosca Pinta <i>Aeneolamia spp.</i> Chinches <i>Blissus spp.</i>	
Banano y Plátano <i>Musa spp.</i>	Picudo negro <i>Cosmopolites sordidus</i> <i>Germer</i>	25-31 g/planta
Frijol y Frijol ejotero <i>Phaseolus vulgaris</i>	Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Gusano alambre <i>Agriotes spp.</i> Chicharrita <i>Empoasca spp.</i> Tortuguillas <i>Diabrotica spp.</i> Saltahojas <i>Empoasca sp.</i> Mosca Blanca <i>Bemisia spp.</i> Pulgones <i>Aphis spp., Myzus spp.</i> Trips <i>Thrips sp</i>	16 kg/ha
Arveja <i>Pisum sativum</i>	Saltahojas <i>Empoasca sp.</i> Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Mosca Blanca <i>Bemisia spp.</i> Pulgones y áfidos <i>Aphis spp. Myzus spp.</i> Trips <i>Thrips spp.</i> Gusano de alambre <i>Agriotes spp.</i> Gusano nochero <i>Agrotis spp.</i> Piojo de zope <i>Euetheola bidentata</i>	16 kg / ha (11 Kg/mz)
Maiz <i>Zea mays</i>	Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Gusano alambre <i>Agriotes sp.</i> Chicharrita <i>Dalbulus spp. Empoasca spp.</i>	16 kg / ha (11 Kg/mz)
Brócoli <i>Brassica oleracea var. italica</i>	Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Gusano alambre <i>Agriotes sp.</i> Mosca negra de la naranja <i>Aleurocanthus spp</i> Pulgones y áfidos <i>Aphis spp., Myzus spp.</i>	16 kg / ha (11 Kg/mz)
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Gusano de alambre <i>Agriotes spp.</i> Gusano nochero <i>Agrotis spp.</i> Chicharrita <i>Dalbulus spp. Empoasca spp.</i> Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Chinches <i>Nezara viridula, Oebalus spp</i> Sogata <i>Sogatodes oryzicola</i>	16 kg / ha (11 Kg/mz)
Papa <i>Solanum tuberosum,</i> Chile <i>Capsicum annum,</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum,</i> Berengena <i>Solanum melongena,</i> Lechuga <i>Lactuca sativa,</i> Pepino <i>Cucumis sativus,</i> Zuchinni <i>Cucurbita sp.</i> Calabaza <i>Cucurbita sp.</i> Cebolla <i>Allium cepa,</i> Ajo <i>Allium sativum,</i> Zanahoria <i>Daucus carota</i>	Afidos, pulgones <i>Aphis spp. Brevicoryne spp Myzus spp.</i> Chicharrita <i>Dalbulus spp. Empoasca spp</i> Escamas <i>Lepidosaphes spp.</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci,</i> Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Gusano alambre <i>Agriotes spp.</i>	16 kg / ha (11 Kg/mz)
Flores y Ornamentales	Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Gusano alambre <i>Agriotes sp.</i> Chicharrita <i>Empoasca spp.</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci,</i> Afidos, pulgones <i>Aphis spp. Myzus spp.</i> Trips <i>Thrips spp.</i>	16 kg / ha (11 Kg/mz)
Café <i>Coffea arabica</i>	Gallina ciega <i>Phyllophaga spp.</i> Gusano alambre <i>Agriotes sp.</i> Piojo blanco de la raíz <i>Dysmicoccus bispinosus</i> Piojo blanco de la cabellera <i>Geococcus coffeae</i> Cochinilla <i>Pseudococcus spp.</i> Escamas <i>Coccus spp., Unaspis spp., Saissetia oleae</i>	16 kg / ha (11 Kg/mz)
Recomendaciones de uso en Nicaragua y República Dominicana		
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	<i>Aeneolamia postica</i>	16 kg / ha

El uso de este producto, de acuerdo con los periodos de carencia y limites de tolerancia en los cultivos de exportación recomendados en este catálogo y con apego a las normas legales del país productor y del país importador, es responsabilidad exclusiva del usuario. En caso de duda, consulte las publicaciones respectivas o al técnico en la materia. Es responsabilidad del usuario leer la etiqueta y el panfleto del producto para su correcta dosificación, aplicación, usos recomendados, uso de equipo de protección personal y medidas de protección para la cosecha, las personas y el medio ambiente.