



Inicio › Productos › Biológicos › Requiem® Prime

Requiem® Prime

REQUIEM® PRIME es un insecticida-acaricida foliar que contiene como sustancia activa la mezcla de terpenoides naturales QRD 460 (terpineno, p-cimeno, d-limoneno), presentes en el aceite esencial de la planta aromática *Chenopodium ambrosioides*. El producto actúa degradando las cutículas delgadas de insectos y ácaros, produciendo la disrupción de su movilidad y actividad respiratoria. Se muestra activo sobre diversos grupos de plagas como moscas blancas, trips y ácaros.

Aplicaciones autorizadas y dosis de empleo:

REQUIEM® PRIME está autorizado para su uso en los siguientes cultivos en invernadero:

Cultivo	Plaga	Dosis	Volumen de caldo y dosis máxima (L/ha)
Solanáceas: berenjena y tomate	<i>Trialeurodes vaporarum</i>	0,4-0,65%	750-1500 (750 en estadio temprano y 1500 en estadio tardío) Dosis máxima 10 L/ha
	<i>Bemisia tabaci</i>		
	<i>Frankliniella occidentalis</i>		
	<i>Tetranychus urticae</i>		
Cucurbitáceas: calabacín y calabaza	<i>Trialeurodes vaporarum</i>	0,4-0,65%	500-1000 Dosis máxima 6,5 L/ha
	<i>Bemisia tabaci</i>		
	<i>Frankliniella occidentalis</i>		
	<i>Tetranychus urticae</i>		
Cucurbitáceas: melón, pepino y sandía	<i>Trialeurodes vaporarum</i>	0,4-0,65%	750-1500 (750 en estadio temprano y 1500 en estadio tardío) Dosis máxima 10 L/ha
	<i>Bemisia tabaci</i>		
	<i>Frankliniella occidentalis</i>		
	<i>Tetranychus urticae</i>		

Condiciones generales de uso: Aplicar en pulverización foliar manual, a inicio de presencia de la plaga. Uso sólo en invernadero.

En el cultivo cubierto de solanáceas y cucurbitáceas, el efecto contra trips, mosca blanca y ácaros puede ser insuficiente. Es recomendable integrarlo dentro de estrategias de gestión integrada de plagas.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones al año en berenjena, melón, pepino, sandía y tomate, 3 aplicaciones en calabacín y calabaza, con intervalos entre aplicaciones de 7 días.

Aplicar durante todo el año entre BBCH 12-89.

Recomendaciones de uso seguro:

Se recomienda aplicar el producto en bloques de 2-3 aplicaciones (intervalo de 7 días) Aplicar el producto solo, evitando mezclas en tanque con otros productos. Respetar 3 días entre la aplicación de Requiem® Prime y aplicaciones previas o posteriores. Respetar plazos de 7 días con tratamientos foliares con estrobilurinas y formulados a base de fluopyram. En nuevas variedades es recomendable realizar pruebas previas de selectividad a pequeña escala antes de realizar aplicaciones generalizadas.

Plazo de seguridad para la recolección:

No procede: El producto se disipa rápidamente después de su aplicación, por lo que no es necesario establecer plazos de seguridad para la recolección.